

サムコルフロアブル10（農林水産省登録番号 第22469号）

適用害虫の範囲及び使用方法

令和2年11月25日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロラントリブ [®] ロール を含む農薬の 総使用回数
りんご	シクムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 ギンモンホリガ ギンモンハメグリガ ヒメダク	2500～ 5000倍	200～ 700L/10a	収穫 前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ヨモギエダシヤク オオタバコガ	5000倍					
なし	ケムシ類 シクムシ類	2500～ 5000倍					
	ハマキムシ類 ヒメダク	5000倍					
かき	ハマキムシ類 ケムシ類 ヒロハリアオイガ カキハタムシガ ハスモンヨトウ フタモンダラメイガ						
	ぶどう						
おうとう		コスカシバ					
	ハマキムシ類 ケムシ類	2500～ 5000倍					
	オトウシヨウジヨウ バエ	2500倍					
うめ	ノメカブリキリガ コスカシバ	5000倍					
	ケムシ類	2500～ 5000倍					
	ハマキムシ類	2500倍					
すもも	シクムシ類	2500～ 5000倍					
あんず	ケムシ類 ハマキムシ類						
ふさすぐり	スグリコスカシバ	2500倍					
もも	シクムシ類 ハマキムシ類	5000倍					
ネктリン	モモハメグリガ コスカシバ						
さとうきび	イネトウ		100～ 300L/10a				
		50倍	2.4L/10a				
茶	チャノコクモシハマキ チャハマキ ヨモギエダシヤク	2000倍	200～ 400L/10a	摘採 3日前まで	1回	散布	1回
	チャノソリガ	2000～ 4000倍					
	ハスモンヨトウ	4000倍					

- 【成分】 クロラントラニリプロール（通称：リナキシピル） 10.0%
水、界面活性剤等 90.0%
- 【性状】 淡褐色水和性粘稠懸濁液体

殺虫剤分類

28

効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節してください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
 - 1) 散布は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - 2) 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - 3) 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 過度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせ使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 本剤は皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意してください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- ラベルをよく読んでください。
- 記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届くところには置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 防除日誌を記帳しましょう。

サムコルフロアブル 10 の製品ページは[こちら](#)