

プレバソン粒剤（農林水産省登録番号 第23007号）

適用病害虫の範囲及び使用方法

令和4年7月6日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クワントレニプロールを含む農薬の総使用回数
さとうきび	メイチュウ類	4～6kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	4回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は3回以内)
			生育期 但し最終培土まで		株元散布	
	ツマジノクサヨトウ	6kg/10a	植付時		植溝土壌混和	
			生育期 但し最終培土まで		株元散布	
キャベツ	コナガ ハイマダノメイガ アオムシ	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り 50g	育苗期後半 ～定植当日		本剤の所定量を セル成型育苗 トレイまたは ペーパーポットの上 から均一に散布 する	
		1g/株	育苗期後半 ～定植時		株元散布	
はくさい	コナガ ハイマダノメイガ アオムシ	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り 50g	育苗期後半 ～定植当日		本剤の所定量を セル成型育苗 トレイまたは ペーパーポットの上 から均一に散布 する	
		1g/株	育苗期後半 ～定植時		株元散布	
ブロッコリー	コナガ ハイマダノメイガ アオムシ	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り 50g	育苗期後半 ～定植当日	本剤の所定量を セル成型育苗 トレイまたは ペーパーポットの上 から均一に散布 する		
		1g/株	育苗期後半 ～定植時	株元散布		
レタス	ナメグリハエ オオタバコガ	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り 50g	育苗期後半 ～定植当日	本剤の所定量を セル成型育苗 トレイまたは ペーパーポットの上 から均一に散布 する		
		1g/株	育苗期後半 ～定植時	株元散布		

(つづき)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロラントラニプロール を含む農薬の総 使用回数
トマト	ネリムシ類 ハモグリバエ類	1g/株	育苗期後半 ～定植時	1回	株元散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回 以内、散布は 3回以内)
きゅうり	ハモグリバエ類					3回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、散布は 2回以内)
なす	ネリムシ類 ハモグリバエ類					

【成分】 クロラントラニプロール (通称：リナキシピル) 0.5%  
鋳物質細粒等 99.5%

【性状】 類白色細粒

殺虫剤分類

28

#### 効果・薬害等の注意

●本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

#### 安全使用上の注意

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

- ラベルをよく読んでください。
- 記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届くところには置かないでください。
- 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。