

FMC

野菜散布用殺虫剤

ベネビア<sup>®</sup> OD

powered by

CYAZYPYR<sup>®</sup>  
ACTIVE INGREDIENT



さあ、散布しよう!

サニーレタス、レタス、はくさい、キャベツが隣接している場合もドリフトの心配が減りました。

非結球レタス  
に登録拡大!

**チョウ目、アブラムシ類、ハモグリバエ類などに高い効果**

**約2週間の長い残効**

**食害をすぐ止める**

■適用害虫と使用方法(適用表から一部抜粋)

2019年12月現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ ウバ類、オオタバコガ	2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍					
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ	2000~4000倍					
	アブラムシ類、キスジノミハムシ	2000倍					
ブロッコリー	アオムシ、ハスモンヨトウ、コナガ	2000~4000倍					
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍					
レタス 非結球レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000~4000倍					
	ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍					
ねぎ	シロイチモジヨトウ、アザミウマ類 ハモグリバエ類		2000倍	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の処理は3回以内 (但し、株元灌注は1回以内))			

その他の登録作物：だいこん、トマト、ミニトマト、きゅうり、ピーマン、いちご、えだまめ、だいず、たまねぎ、やまのいも、かんしょ、ばれいしょ、かぼちゃ、アスパラガス、未成熟とうもろこし、にんじん、さやいんげん、オクラ、ししとう、たばこ

■混用事例(葉菜のみ抜粋)

2019年7月5日作成

殺菌剤	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	ねぎ	殺菌剤	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	ねぎ	殺菌剤	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	ねぎ	
アグリマイシン100(水)	●	●		●		バイオキーパー(水)		●	●		●	アグロスリン(乳)					●	●
アグレプト(液)	●	●				バリダシン5(液)	●	●		●	●	アドマイヤー(FL)					●	●
アフエット(FL)	●	●	●	●	●	ヒトマイシン(液)S		●				コルト(WG)		●			●	●
アミスター 20(FL)	●	●	●	●	●	ファンタジスタ(WG)	●					スタークル/アルパリン(SG)		●	●		●	●
アリエッティ(水)					●	フォリオゴールド	●	●		●		トレボン(乳)	●	●			●	
オーンサイド80(水)		●				フルピカ(FL)					●	ハチハチ(乳)						●
オンリーワン(FL)					●	プロポーズ(WG)	●	●				ベストガード(溶)					●	
カセット(水)	●	●	●			ベジセイパー	●	●		●		モスピラン(溶)		●	●		●	●
カンタス(DF)	◎		◎	◎		ベトファイター(WG)					●	ランネット45(DF)					●	●
カンパネラ(水)					●	ベルクート(水)	●			●	●						●	●
ゲッター(水)	●			●		ベンコゼブ(FL)	●				●*							
サブロール(乳)					●	ベンコゼブ(水)		●										
ザンプロDM(FL)					●	ベンレート(水)	●	●		●	●							
シグナム(WG)	●	●	●	●		ポリオキシソル(水)					●							●
ジマンダイセン(水)	●	●			●	ポリバリン(水)					●							●
スターナ(水)	●	●	●	●	●*	マスターピース(水)			●									
ストロビー(FL)		●			●	モンカット(FL)	●											
スミレックス(水)				●	●	ライメイ(FL)	●	●	●									
セイビア20(FL)	●					ラリー(水)					●							
ソタール(WG)	●	●				ランマン(FL)	●	●	●	●	●							●
ダイアメリット(DF)					●	リゾレックス(水)	●											●
ダコニール1000(FL)		●		●	●	リドミルゴールドMZ	●	●			●*							
テーク(水)					●	レーバス(FL)	●	●	●	●	●							
トップジンM(水)	●	●		●	●	ロブラール(水)	●	●		●	●							●

●印は試験を実施し、混用して問題がなかった事例\*です。新たな情報が得られた場合には、●印の薬剤が追加されることがあります。  
 (※：品種、栽培条件、使用濃度、使用時期などにより結果が異なる可能性があります。したがって、本表で●であって「薬害がない」ということを保証するものではありません。あくまでも混用知見の一例として考えていただきますようお願いいたします。)

● 混用して問題なかった  
 ◎ 使用直前の混用なら問題なかった  
 ▲ 薬害の事例があった。  
 × 混用できない。  
 空欄 表記するに足る知見や経験に乏しい

\* 老化等の軟弱苗には軽度のへこみ等の症状が発生することがある。  
 \*\* 外葉の葉裏に褐変・萎縮の症状が発生することがある。

(乳)乳剤、(水)水和剤、(液)液剤、(溶)水溶剤、(DF)ドライフロアブル剤  
 (FL)フロアブル剤、(WG)顆粒水和剤、(SG)顆粒水溶剤

■使用の際の注意事項(抜粋)

- やむを得ず、他の薬剤と混用する場合には、事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。特に、銅剤との混用は薬害を生じるおそれがあるので、混用はしないでください。
- はくさいに使用する場合、展着剤を加用すると薬害を生じる場合があるので、加用に当っては事前にその適否を確認してください。

●ラベルをよく読んでください。 ●記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。  
 ●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

